


# Letzte Seite

## Lösung Periskop

Natürlich ist die häufigste kardiovaskuläre Komplikation des akuten Kokain-Konsums die akute Kononarinsuffizienz und der Myokardinfarkt. Aber nicht immer! Im vorliegenden Fall ergibt die Thoraxaufnahme ein verbreitertes Mediastinum und «gestaute» Hili, eine transthorakale Echokardiographie ein Hämoperikard und eine Dissektion der Aorta ascendens.

Nicht zu früh: zu diesem Zeitpunkt beträgt der systolische BD eben noch 54 mm Hg. Es eilt: Thorakotomie, Bioprothese der Aorta ascendens und komplikationsloser Verlauf. Angesichts der Verbreitung des Kokainkonsums (25 Mio. der Amerikaner haben wenigstens 1mal Kokain konsumiert und 1,5 Mio. sind aktuelle Konsumenten!) eine nützliche «injection de rappel». – *Nallamothu BK, et al. Of nocks and time. New Engl J Med 2001;345:359–63.*


[www.medicalforum.ch](http://www.medicalforum.ch)



online since January 2001

[www.emh.ch](http://www.emh.ch)

The medical portal of the Swiss Medical Publishers Ltd.



Wir bieten Ihnen Informationen, die Sie nicht überall erhalten:

- Die vollständige Datenbank von schweizerischen Medizinaladressen
- Den Kongresskalender der Schweizerischen Ärztezeitung
- Direkten Zugang zu den EMH-Zeitschriften mit Volltextsuche
- EMH Interactive (Diskussionsforen)
- Direktsuche bei Medline
- Unsere Linksammlung
- EMH-Shop
- EMH-Bücher