

## Corrigendum

Concerne: Zellweger T, Gasser T. Urologie: Incontinence urinaire – Quand quel traitement? Forum Med Suisse. 2007;7(1):35–7.

Malheureusement quelques corrections d'auteurs n'ont pas été reprises dans le «Highlight» d'urologie de Tobias Zellweger et Thomas Gasser. Une erreur se trouve ainsi entre autres dans le tableau 1: la darifénacine n'est pas un spasmolytique mais un anticholinergique.

Nous prions les auteurs de nous excuser de cette erreur. Ci-dessous vous trouverez la version corrigée du tableau 1. La version en ligne de l'article a été corrigée dans les plus brefs délais.

Tableau 1. Options de traitement médicamenteux de l'incontinence.

Effet/ Classe thérapeutique	Principe actif	Nom déposé	Dose journalière maximale	Effets indésirables typiques
A Relaxation du détroisor				
Anticholinergiques	Oxybutynine <sup>1</sup>	Ditropan®	3× 5 mg	} Xérostomie, Constipation, Troubles visuels, Obnubilation
		Lyrinel®		
	Chlorure de trospium <sup>1</sup>	Spasmo-Urgénine® Neo	2× 20 mg	
	Toltérodine <sup>1</sup>	Detrusitol®	1× 4 mg	
	Solifénacine <sup>1</sup>	Vesicare®	1× 10 mg	
Darifénacine <sup>1</sup>	Emselex®	1× 15 mg		
Spasmolytiques	Flavoxate	Urispas®	3× 200 mg	
B Tonification du détroisor				
Parasympathomimétiques	Béthanéchol <sup>1</sup>	Myocholine®	4× 25 mg	} Bradycardie, Hypotension, Diarrhée
	Bromure de distigmine <sup>1</sup>	Ubretid®	1× 5 mg	
C Relaxation du col vésical				
Alphabloquants	Térazosine <sup>1</sup>	Hytrin®	2× 5 mg	} Vertige, Hypotension orthostat, Céphalées
		Alfuzosine	Xatral Uno®	
	Tamsulosine	Pradif T®	1× 0,4 mg	
		Omnice®	1× 0,4mg	
D Tonification du sphincter				
Agonistes alpha	Midodrine <sup>1,2</sup>	Gutron®	3× 2,5 mg	Hypertension, Prurit, Paresthésies
Inhibiteurs de la recapture de sérotonine-noradrénaline	Duloxétine <sup>1,3</sup>	Yentreve®	2× 40 mg	Nausée, Constipation, Xérostomie

<sup>1</sup> Posologie progressive (pour évaluer la tolérance). <sup>2</sup> Pas admis en Suisse dans cette indication.

<sup>3</sup> Introduction en Suisse dès 2007.