


Erratum

Brändli O. Comment traiter une tuberculose en 2008? Forum Med Suisse. 2008;8(37):674–8.

Tableau 3. Indications à la chimiothérapie préventive de la tuberculose latente avec diminution du risque de maladie (de haut en bas).

- | |
|--|
| 1. Patients ayant un VIH/SIDA (surtout avec des CD4 <200/ μ l) ou avant traitement par inhibiteurs du TNF et ayant un test cutané à la tuberculine >5 mm et/ou un test sanguin positif. |
| 2. Nouveau-nés et enfants de <5 ans après exposition à une tuberculose, après exclusion d'une tuberculose active. Commencer d'emblée le traitement préventif jusqu'à exclusion d'une infection par test cutané négatif après 6–8 semaines. |
| 3. Enfants de 5–12 ans après exposition à une tuberculose, uniquement après test cutané positif de >5 mm et/ ou test sanguin positif, après 12 ans uniquement si >10 mm. |
| 4. Patients ayant des foyers tuberculeux jamais encore traités, après exclusion d'une tuberculose active par culture des expectorations. |
| 5. Personnes de <35 ans ayant un test cutané >10 mm et/ou un test sanguin positif. |
| 6. Personnes de >35 ans ayant un test cutané >15 mm et/ou un test sanguin positif, uniquement dans le cadre d'un examen de l'entourage. |

Un lecteur attentif m'a fait remarquer que dans mon article «Comment traiter une tuberculose en 2008?» paru dans le numéro 37 de Forum, la recherche et le traitement de la tuberculose latente ne seraient indiqués que jusqu'à l'âge de 35 ans, selon le tableau 3  publié en page 677. Mais justement dans l'examen de l'entourage, cette recherche est indiquée aussi pour les personnes de plus de 35 ans et le traitement peut être effectué sans problème, en veillant aux effets secondaires, lorsque le test cutané et/ou sanguin est nettement positif. C'est pourquoi nous publions à nouveau le tableau 3 complété.

Correspondance:
Dr Otto Brändli
Pneumologie
Universitätsspital
Rämistrasse 100
CH-8091 Zurich
braendli@swisslung.org