

## Leserbrief

### Nachweis von Blut im Stuhl: die alten Tests nicht vergessen!

Leserbrief zu: Lehner R, et al. Eine hartnäckige Eisenmangelanämie [1].

In diesem sehr interessanten Fall ist der Nachweis des Blutes im Stuhl trotz der anämisierenden Blutungen wiederholt negativ. Dies erinnert uns daran, dass die neuen immunologischen Methoden, auch wenn sie Vorteile haben – wie hohe Spezifität und Bequemlichkeit (keine Diätvorschriften) – für die Blutungen aus dem oberen Gastrointestinaltrakt ungenügend sensitiv sind, da das Hämoglobin bereits verdaut sein kann [2]. So kann ein positiver Häm-Porphyrin- oder guajakbasierender Peroxidasetest bei negativem immunochemischem Hämoglobintest darauf hinweisen, dass die Blutung eher im oberen Gastrointestinaltrakt zu suchen

ist, und umgekehrt. Die Durchführung dieser altertümlichen Tests hilft uns Mühe und Kosten zu sparen und die Belastung der Patienten zu vermindern. Sie sollen aus unserem diagnostischen Arsenal nicht verschwinden.

*Peter Marko*

#### Korrespondenz:

Dr. med. Peter Marko  
Bruggwaldstrasse 39e  
CH-9009 St. Gallen  
[p.marko@bluewin.ch](mailto:p.marko@bluewin.ch)


#### Literatur

- Schweiz Med Forum. 2011;11(34):572–4.
- Marbet U. Testmethoden für okkultes Blut im Stuhl. Schweiz Med Forum. 2006;6(12):291–7.

## ERRATA

### Piqûre de raie tropicale du Maroni (numéro 26/2011)

Dans le numéro 26/2011 du Forum, dans l'article «Piqûre de raie tropicale du Maroni» à la page 463 la fi-

gure 3 , encore juste sur le «bon à tirer», a été coupée à droite par l'imprimerie. Ce qui a fait que l'appareil diffuseur de vapeur d'eau mentionné dans la légende n'était pas visible. Nous prions l'auteur d'accepter nos excuses. L'image entière a été reproduite dans l'édition en ligne.

### Anticoagulation et antiagrégation: marche à suivre péri-interventionnelle

Dans le numéro 23–24/2011 du Forum, trois erreurs se sont faufilees dans la rubrique «Curriculum». Dans l'article «Anticoagulation et antiagrégation: marche à suivre péri-interventionnelle» sur les pages 408 et 409, dans le tableau 2 et 3 est marqué en première ligne de la troisième colonne «Risque sans anticoagulation» au lieu de «Risque sans antiagrégation». Sur la page 412, sur la 7<sup>e</sup> ligne avant la fin est marqué «HNF – 10 000 UI/kg PC/24 h» au lieu de «HNF – 100 UI/kg PC/24 h». La version en ligne a été corrigée.



**Figure 3**

A 20–30 cm de la piqûre, on place un appareil diffuseur de vapeur d'eau pour favoriser l'inactivation du composant thermolabile du venin.