compendium update

Le contenu de cette rubrique est de la responsabilité de Documed SA.

Ce bulletin est un extrait de nos informations sur l'actualité des médicaments. Les informations complètes peuvent être consultées sur compendium.ch by Documed

Sécurité thérapeutique

(III = importance élevée, II = moyenne, I = faible)

II **Clomipramine**

Nouveaux effets indésirables signalés après la mise sur le marché

La clomipramine doit être dosée avec prudence chez les patients insuffisants rénaux et hépatiques, en raison du risque d'augmentation de la concentration plasmatique des métabolites de la clomipramine. Il est recommandé de procéder chez ces patients à un contrôle régulier des enzymes hépatiques, de la fonction rénale et de la concentration plasmatique du principe actif et de ses métabolites. Après la commercialisation, de nouveaux effets indésirables ont été rapportés: syndrome sérotoninergique, symptômes extrapyramidaux, augmentation de la prolactinémie, rhabdomyolyse comme complication d'un syndrome malin des neuroleptiques. Des interactions avec le valproate, le jus de pamplemousse ou d'airelles, les résines échangeuses d'ions et le millepertuis doivent être prises en compte.

II **Clarithromycine**

Contre-indiquée en cas d'antécédents d'allongement de l'intervalle QT, interaction avec l'étravirine

La clarithromycine est contre-indiquée en cas d'antécédents d'allongement de l'intervalle QT ou de tachycardies ventriculaires, y compris torsades de pointes, ainsi qu'en association à la colchicine chez les patients atteint d'insuffisance hépatique. Des cas occasionnels de pertes de conscience, arrêt cardiaque, fibrillations, extrasystoles, asthme et embolies pulmonaires ont été rapportés sous administration parentérale de clarithromycine. En cas de traitement préexistant à l'étravirine, une alternative à la clarithromycine doit être envisagée, car l'efficacité de la clarithromycine contre le groupe Mycobacterium avium est réduite.

II **Léflunomide**

L'omission de la dose de charge réduit le risque d'effets indésirables

Selon l'étude post-marketing LEADER, l'omission de la dose de charge dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde active peut diminuer le risque d'apparition d'effets indésirables.

Innovations

Inlyta® (Axitinib) PFIZER

Nouveau médicament pour le cancer rénal avancé

Inlyta est indiqué dans le traitement de patients atteints d'un carcinome rénal (RCC) avancé après échec d'un traitement systémique préalable. L'axitinib est un inhibiteur de l'activité tyrosine kinase des récepteurs du facteur de croissance endothélial vasculaire VEGFR-1, -2 et -3. La dose orale initiale recommandée est de 5 mg deux fois par jour pendant deux semaines consécutives. La posologie peut être augmentée progressivement en fonction de la tolérance, jusqu'à une dose maximale de 10 mg deux fois par jour.

Mannitol

Autorisation de mise sur le marché européenne pour un traitement complémentaire de la mucoviscidose

La spécialité Bronchitol® (mannitol) vient d'obtenir une AMM européenne dans le traitement de la mucoviscidose pour les patients âgés de 18 ans et plus, comme thérapie complémentaire aux traitements standards. Deux études cliniques de phase III menées chez des adultes ont montré une amélioration de l'évacuation du mucus et de la fonction pulmonaire, ainsi qu'une réduction des exacerbations respiratoires. Chez les patients traités pendant 6 mois, Bronchitol a entraîné une baisse des épisodes infectieux. Le produit a par ailleurs été bien toléré. En Suisse, Bronchitol bénéficie du statut de médicament orphelin depuis novembre 2010.

Marché



Rispéridone Sandoz® Solufilm SANDOZ
Nouvelle spécialité.
Rispéridone en films orodispersibles blancs, de tailles différentes, dosés à 0,5 mg, 1 mg, 2 mg et 3 mg. Posés directement sur la langue, ils se désintègrent rapidement et peuvent ainsi être avalés sans problème.

Simépar-Mepha® MEPHA PHARMA
Nouvelle spécialité.
Silymarine en capsules à 70 mg avec diverses vitamines du groupe B.