

# compendium update

Octobre 2012



Le contenu de cette rubrique est de la responsabilité de Documed SA.

Ce bulletin est un extrait de nos informations sur l'actualité des médicaments. Les informations complètes peuvent être consultées sur [compendium.ch](http://compendium.ch)

## Sécurité thérapeutique

(III = importance élevée, II = moyenne, I = faible)

### II Aspirine Cardio® 100/300

#### Nouvelles recommandations posologiques

La posologie recommandée en prévention des thromboses après pontage aorto-coronarien et angioplastie coronarienne trans-luminale percutanée (ATL) est dorénavant de 100–300 mg/jour (anciennement 100 mg/jour).

### II Bupropion

#### Influence sur les méthodes de diagnostic

Il existe des rapports signalant des interférences entre le bupropion et certains tests urinaires rapides de dépistage de drogues, ayant conduit à des résultats faux-positifs, en particulier pour les amphétamines. Les résultats positifs devraient donc être vérifiés à l'aide de méthodes chimiques plus spécifiques.

### II Liraglutide

#### Effets indésirables rénaux

Des troubles de la fonction rénale, dont une insuffisance rénale, ont été occasionnellement rapportés.

## Innovations

### Oracea® (doxycycline) GALDERMA

#### Doxycycline à faible dose pour réduire les lésions papulopustuleuses chez l'adulte atteint de couperose

Oracea est une préparation de doxycycline faiblement dosée, à libération partiellement retardée, qui est indiquée pour la réduction des lésions papulopustuleuses chez l'adulte atteint de rosacée au visage. Une capsule contient 40 mg de principe actif (dose journalière), dont 30 mg à libération rapide et 10 mg à libération retardée. Cette formulation galénique permet d'atteindre des taux plasmatiques constants, nettement inférieurs au seuil d'action antimicrobienne pour la plupart des germes. On utilise ainsi les propriétés anti-inflammatoires de la doxycycline tout en réduisant le risque de développement de souches bactériennes résistantes.

### Zoely® (estradiol, nomégestrol) MSD

#### Nouveau contraceptif monophasique

La première pilule monophasique avec un estrogène bio-identique, le 17 $\beta$ -estradiol, est maintenant commercialisée en Suisse. Le progestatif est l'acétate de nomégestrol, progestatif hautement sélectif. Il exerce une activité anti-gonadotrope, une activité anti-œstrogénique médiée par les récepteurs de la progestérone, ainsi qu'une activité anti-androgénique modérée. Zoely se compose de 24 comprimés actifs contenant 2,5 mg d'acétate de nomégestrol et 1,5 mg d'estradiol (sous forme hémihydratée) et de 4 comprimés placebo.

### Axanum® (acide acétylsalicylique, ésoméprazole) ASTRAZENECA

#### Association d'acide acétylsalicylique et d'un IPP pour l'inhibition de l'agrégation plaquettaire

Une nouvelle spécialité combinant 81 mg d'acide acétylsalicylique (AAS) et 20 mg d'ésoméprazole est disponible en Suisse. L'IPP se présente sous la forme de granulés gastrorésistants à l'intérieur de la capsule. Axanum est autorisé pour la prévention d'événements thromboemboliques cardio-vasculaires ou cérébrovasculaires chez les patients adultes qui nécessitent un traitement chronique à l'AAS faiblement dosé et qui présentent un risque accru de développer des ulcères gastriques et/ou duodénaux dus à l'AAS.

## Marché



### Candésartan Actavis ACTAVIS

#### Nouvelle spécialité

Candésartan cilexétel en comprimés à 4, 8, 16 et 32 mg. En dessus de la rainure de fragmentation est inscrit «C», en dessous le dosage respectif en candésartan cilexétel.



### Ketorolac Medano® MEDANO

#### Nouvelle spécialité

Kétorolac à présent disponible sous forme de générique à usage ophtalmique. 1 goutte contient 0,25 mg de kétorolac trométhamine.