

compendium update

Août 2013



Le contenu de cette rubrique est de la responsabilité de Documed SA.

Ce bulletin est un extrait de nos informations sur l'actualité des médicaments. Les informations complètes peuvent être consultées sur compendium.ch

Sécurité thérapeutique

(III = importance élevée, II = moyenne, I = faible)

II Cimzia® solution injectable

Effet indésirable: carcinome à cellules de Merkel

Des mélanomes et des carcinomes à cellules de Merkel ont été rapportés après la mise sur le marché chez des patients traités par des antagonistes du TNF, y compris Cimzia. Il est recommandé d'effectuer régulièrement des examens cutanés pour tous les patients, en particulier ceux présentant des facteurs de risque de cancer de la peau.

II Tysabri® 300 mg

Survenue d'une LEMP après l'arrêt du Tysabri

Une leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP) est survenue après l'arrêt de Tysabri chez des patients qui ne présentaient pas de signes d'une éventuelle LEMP au moment de l'arrêt du traitement. Après l'arrêt du traitement par Tysabri, les patients et les médecins doivent donc rester attentifs à tout nouveau signe ou symptôme d'une éventuelle LEMP pendant environ six mois.

II neo-angin® forte

Dose quotidienne maximale

La dose quotidienne de 12 pastilles forte ne doit pas être dépassée chez les adultes et les adolescents dès 12 ans.

Innovations

Cialis® (tadalafil) LILLY

Extension d'indication

Cialis est désormais indiqué pour le traitement des symptômes fonctionnels d'une hyperplasie bénigne de la prostate. La dose recommandée est de 5 mg une fois par jour, à prendre approximativement au même moment de la journée. Chez les patients qui constatent des effets indésirables intolérables, une réduction de la dose à 2,5 mg peut être envisagée. Une dose maximale de 5 mg ne doit pas être dépassée en cas d'utilisation quotidienne. Chez les patients qui présentent à la fois une hyperplasie bénigne de la prostate et une dysfonction érectile et qui sont traités avec 5 mg de tadalafil par jour, aucune utilisation supplémentaire de tadalafil à la demande ne doit être faite.

Erivedge® (vismodégibe) ROCHE

Premier inhibiteur sélectif de la voie de signalisation Hedgehog

Erivedge (vismodégibe) est à présent commercialisé en Suisse. Il s'agit du premier inhibiteur sélectif de la voie de signalisation Hedgehog. Il est indiqué dans le traitement des adultes atteints de carcinome basocellulaire avancé (CBC) pour lesquels la chirurgie ou la radiothérapie ne sont pas envisageables.

Zonegran® (zonisamide) EISAI PHARMA

Extension d'indication: monothérapie

Jusqu'à présent, Zonegran était indiqué uniquement en association dans le traitement des crises épileptiques partielles avec ou sans généralisation secondaire chez les adultes. Chez ces patients dont l'épilepsie a été nouvellement diagnostiquée, Zonegran peut désormais aussi être utilisé en monothérapie.

Marché



Montelukast Sandoz® SANDOZ

Nouvelle commercialisation

Sachets à 4 mg, comprimés à mâcher à 4 mg, 5 mg et comprimés pelliculés à 10 mg de montelukast.



Lévétiracétam-Mepha® solution MEPHA

Nouvelle spécialité

Solution (avec pipette doseuse) à 100 mg/ml de lévétiracétam.