compendium update

April 2013

Die inhaltliche Verantwortung für die Rubrik «compendium update» liegt bei der Documed AG.

Dieses Bulletin ist ein Auszug aus unseren aktuellen Arzneimittelinformationen. Vollständige Informationen finden Sie unter compendium.ch by Documed

Arzneimittelsicherheit

(III = hohe, II = mittlere, I = geringe Relevanz)

II **Panadol® C**
Anwendungseinschränkung
Panadol C Brausetabletten sind neu für die Verabreichung an Kinder unter 12 Jahren (bisher 6 Jahre) oder unter 40 kg (bisher 22) Körpergewicht nicht mehr indiziert.

I **Rasagilin**
Kontraindikation mit Hypericum, Berichte über Serotonin-Syndrom bei gleichzeitiger Anwendung mit Antidepressiva
Rasagilin soll nicht zusammen mit Arzneimitteln, die Johanniskraut enthalten, verabreicht werden, da mit schweren Nebenwirkungen zu rechnen ist. Seit Markteinführung wurden bei Patienten, die gleichzeitig mit Antidepressiva/SNRI und Rasagilin behandelt wurden, über Fälle eines Serotonin-Syndroms in Verbindung mit Agitation, Verwirrungszuständen, Rigidität, Pyrexie und Myoklonus berichtet.

I **Sulfasalazin**
Präzisierte Richtlinien bezüglich Patientenmonitoring
Ein komplettes Blutbild einschliesslich Differenzialbild der weissen Blutzellen sowie Leberfunktionstests sollten vor Beginn der Sulfasalazin-Therapie und jede zweite Woche während der ersten 3 Behandlungsmonate durchgeführt werden. Vom 4. bis 6. Monat sollten die gleichen Tests einmal monatlich und danach alle 3 Monate bzw. nach Ermessen des behandelnden Arztes durchgeführt werden. Eine Untersuchung der Nierenfunktion (einschliesslich Urinstatus) sollte bei allen Patienten zu Beginn und mindestens einmal monatlich während der ersten 3 Behandlungsmonate durchgeführt werden.

Innovationen

ATG-Fresenius® FRESENIUS MEDICAL CARE
Indikationserweiterung
ATG-Fresenius ist neu indiziert zur Prävention der Graft-versus-Host-Erkrankung (GVHD) in Kombination mit der Standardprophylaxe Cyclosporin A/Methotrexat bei SCT mit HLA-kompatiblen, nicht-verwandten Spendern bei Erwachsenen mit malignen hämatologischen Erkrankungen.

Fycompa® (Perampanel) EISAI PHARMA
Erster AMPA-Rezeptorantagonist bei Epilepsie
Mit Fycompa steht nun auch in der Schweiz das erste Antiepileptikum aus der Gruppe der AMPA-Rezeptorantagonisten zur Verfügung. Die neue Wirkstoffklasse eröffnet insbesondere in therapieresistenten Fällen eine zusätzliche Behandlungsoption. Fycompa ist indiziert als Zusatztherapie fokaler Anfälle mit oder ohne sekundäre Generalisierung bei Epilepsiepatienten ab 12 Jahren.

Salvacyl® (Triptorelin) DEBIO
Triptorelin bei Sexualdeviationen
Triptorelin ist ein GnRH-Agonist, welcher für verschiedenste Indikationen wie Prostatakarzinom, Endometriose oder Downregulation im Rahmen der Reproduktionsmedizin verwendet wird. Mit der Zulassung der Spezialität Salvacyl wurde das Anwendungsgebiet von Triptorelin erweitert. Das Arzneimittel ist angezeigt zur reversiblen und (über mehr als drei Monate) anhaltenden Reduktion der Testosteronspiegel auf Kastrationsniveau bei erwachsenen Männern mit sexuellen Devianzen und wird alle zwölf Wochen intramuskulär injiziert.

Markt

Desloratadin Actavis ACTAVIS
Neu im Handel
Eine Filmtablette enthält 5 mg Desloratadin. Die blauen runden Tabletten enthalten auf einer Seite die Prägung «LT».

Ketalgin® AMINO
Sortimentserweiterung
Neben den Tabletten zu 5 mg und 10 mg Methadon hydrochlorid sind neu Tabletten zu 40 mg erhältlich.