

compendium update

August 2013



Die inhaltliche Verantwortung für die Rubrik «compendium update» liegt bei der Documed AG.

Dieses Bulletin ist ein Auszug aus unseren aktuellen Arzneimittelinformationen. Vollständige Informationen finden Sie unter compendium.ch

by Documed

Arzneimittelsicherheit

(III = hohe, II = mittlere, I = geringe Relevanz)

II Cimzia® Injektionslösung

Unerwünschte Wirkung: Merkelzellkarzinom

Bei Patienten, die mit TNF-Antagonisten einschliesslich Cimzia behandelt wurden, wurden Fälle von Melanomen und Merkelzellkarzinomen in der Post-Marketing-Phase beobachtet. Regelmässige Hautuntersuchungen werden für alle Patienten empfohlen, besonders für solche mit Risikofaktoren für Hautkrebs.

II Tysabri® 300 mg

Auftreten von PML nach Absetzen von Tysabri

Eine progressive multifokale Leukoenzephalopathie (PML) ist nach Absetzen von Tysabri bei Patienten aufgetreten, die zum Zeitpunkt der Beendigung der Behandlung keine Anzeichen einer möglichen PML aufwiesen. Patienten und Ärzte müssen daher auch nach Beendigung der Behandlung mit Tysabri etwa sechs Monate lang auf alle neuen Anzeichen oder Symptome einer möglichen PML achten.

II neo-angin® forte

Maximale Tagesdosis

Eine Tageshöchst-dosis von 12 Pastillen forte darf bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren nicht überschritten werden.

Innovationen

Cialis® (Tadalafil) LILLY

Indikationserweiterung

Cialis ist neu zur Therapie der funktionellen Symptome einer benignen Prostatahyperplasie indiziert. Die empfohlene Dosis beträgt 5 mg einmal täglich, jeweils etwa zur gleichen Tageszeit eingenommen. Bei Patienten, die nicht tolerierbare unerwünschte Wirkungen feststellen, kann eine Reduzierung der Dosis auf 2,5 mg in Erwägung gezogen werden. Eine Maximaldosis von 5 mg darf bei täglicher Anwendung nicht überschritten werden. Bei Patienten, welche sowohl eine benigne Prostatahyperplasie als auch eine erektile Dysfunktion aufweisen und die mit 5 mg Tadalafil/Tag behandelt werden, darf keine zusätzliche Anwendung von Tadalafil auf Bedarfsbasis erfolgen.

Erivedge® (Vismodegib) ROCHE

Erster selektiver Hedgehog-Signalweg-Inhibitor

In der Schweiz ist neu Erivedge (Vismodegib) im Handel. Es handelt sich dabei um den ersten selektiven Hedgehog-Signalweg-Inhibitor. Erivedge ist indiziert zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem Basalzellkarzinom (BCC), für die eine chirurgische Behandlung oder Strahlentherapie nicht in Betracht kommt.

Zonegran® (Zonisamid) EISAI PHARMA

Indikationserweiterung: Monotherapie

Zonegran war bisher für die Behandlung von fokalen Anfällen mit oder ohne sekundäre Generalisierung bei Erwachsenen nur als Zusatztherapie indiziert. Neu kann Zonegran auch als Monotherapie für die Behandlung dieser Patienten angewendet werden, sofern die Epilepsie neu diagnostiziert ist.

Markt



Montelukast Sandoz® SANDOZ

Neu im Handel

Es sind Sachets zu 4 mg, Kautabletten zu 4 mg bzw. 5 mg und Filmtabletten zu 10 mg Montelukast erhältlich.



Levetiracetam-Mepha®

Lösung MEPHA

Neu im Handel

Die Lösung mit Dosierpipette ist zu 100 mg/ml Levetiracetam erhältlich.