

compendium update

Août 2014



Le contenu de cette rubrique est de la responsabilité de Documed SA.

Ce bulletin est un extrait de nos informations sur l'actualité des médicaments. Les informations complètes peuvent être consultées sur compendium.ch

Sécurité thérapeutique

(III = importance élevée, II = moyenne, I = faible)

II Haldol® (halopéridol)

Indication relative à l'analgésie supprimée, nouvelles recommandations posologiques pédiatriques

Haldol n'est plus indiqué comme adjuvant aux analgésiques en cas de fortes douleurs chroniques d'étiologies diverses. Les recommandations posologiques pour les enfants et adolescents ont été adaptées.

II Quinapril

Nouvelles contre-indications

L'association de quinapril et d'antagonistes de l'angiotensine ou d'autres inhibiteurs de l'ECA est contre-indiquée chez les patients diabétiques avec des lésions des organes cibles, présentant une insuffisance rénale modérée ou sévère (GFR <60 ml/min/1,73 m²), une hyperkaliémie (>5 mmol/l) ou chez les patients hypotendus présentant une insuffisance cardiaque congestive. L'association de quinapril et d'aliskirène est également contre-indiquée chez les patients présentant une hyperkaliémie (>5 mmol/l) ou chez les patients hypotendus présentant une insuffisance cardiaque congestive.

I ferro sanol® (fer)

Précisions dans la posologie

ferro sanol ne doit être administré aux enfants dès 6 ans que s'ils ont un poids corporel d'au moins 20 kg.

En cas de carence en fer marquée chez les adultes et les adolescents dès 15 ans, la posologie initiale peut être de 2 capsules (auparavant 2-3 capsules).

I Olanzapine

Nouveaux effets indésirables

Les effets indésirables suivants ont été rapportés: fièvre, arthralgie, épistaxis, augmentation des gamma-glutamyltransférases et de l'uricémie.

Innovations

ILARIS® (canakinumab) NOVARTIS PHARMA

Extension d'indications: arthrite juvénile idiopathique systémique

ILARIS est désormais également indiqué pour le traitement de l'arthrite juvénile idiopathique systémique active chez les patients à partir de 2 ans, qui ont présenté une réponse insuffisante à un précédent traitement par anti-inflammatoires non stéroïdiens et par corticoïdes systémiques. ILARIS peut être utilisé en monothérapie ou en association au méthotrexate.

Dificlir™ (fidaxomicine) ASTELLAS

Nouvel antibiotique pour les infections à Clostridium difficile

Swissmedic a délivré en mai 2014 une autorisation de mise sur le marché pour la fidaxomicine, un nouvel antibiotique oral de type macrocyclique indiqué dans le traitement des diarrhées associées à Clostridium difficile. Dificlir est à présent disponible sur le marché en Suisse sous la forme de comprimés à 200 mg, à prendre deux fois par jour pendant 10 jours.

Empagliflozine

Autorisation européenne pour le troisième inhibiteur de SGLT2

L'agence européenne du médicament EMA a donné une autorisation de mise sur le marché pour l'empagliflozine (Jardiance). Ce nouvel inhibiteur de SGLT2 est utilisé pour le traitement adjuvant associé des adultes souffrant de diabète de type 2, mais peut également être appliqué en monothérapie en cas d'intolérance à la metformine. En Allemagne, la mise sur le marché est prévue pour cet été. Aucune date n'est encore connue concernant la commercialisation en Suisse.

Marché



DEXILANT® TAKEDA

Nouvelle commercialisation

Capsules à 30 mg et 60 mg de dexlansoprazole.



Moxifloxacin Sandoz® SANDOZ

Nouvelle commercialisation

Comprimés pelliculés à 400 mg de moxifloxacin.