

compendium update

Septembre 2014



Le contenu de cette rubrique est de la responsabilité de Documed SA.

Ce bulletin est un extrait de nos informations sur l'actualité des médicaments. Les informations complètes peuvent être consultées sur compendium.ch

Sécurité thérapeutique

(III = importance élevée, II = moyenne, I = faible)

II Actemra® (tocilizumab)

Nouvel effet indésirable

Des cas de syndrome de Stevens-Johnson ont été rapportés sous traitement par le tocilizumab.

II Olbetam® (acipimox)

Directives posologiques plus strictes en cas d'insuffisance rénale

En cas d'insuffisance rénale, la posologie doit être adaptée en fonction de la clairance de la créatinine: 1 gélule d'Olbetam/jour pour des valeurs comprises entre 40 et 60 ml/min (auparavant entre 40 et 80 ml/min) et 1 gélule d'Olbetam tous les deux jours pour des valeurs comprises entre 30 et 40 ml/min (auparavant entre 20 et 40 ml/min).

Olbetam est contre-indiqué en cas d'une clairance de la créatinine <30 ml/min (auparavant <10 ml/min).

II Rocaltrol® (calcitriol)

Recommandations posologiques pour les nourrissons et enfants en bas âge supprimées

La sécurité et l'efficacité des capsules de Rocaltrol n'ayant pas fait l'objet d'études suffisantes chez l'enfant, les recommandations posologiques pour les nourrissons et enfants en bas âge ont été supprimées.

II Zytiga® (abiratéron)

Interactions avec des inducteurs puissants du CYP3A4

Un traitement concomitant par des inducteurs puissants du CYP3A4 (par ex. phénytoïne, carbamazépine, rifampicine, rifabutine, phénobarbital, millepertuis) devrait être évité, car il y a un risque de réduction de l'efficacité de Zytiga.

Innovations

Amitiza® (lubiprostone) SUCAMPO

Extension d'indications: constipation induite par les opiacés

Amitiza est nouvellement indiqué dans le traitement de la constipation induite par les opiacés associée à des signes et à des symptômes tels que des selles de consistance dure, un passage de selles douloureux, une constipation sévère, des troubles abdominaux et des ballonnements chez les patients dès 18 ans souffrant de douleurs chroniques non cancéreuses.

L'efficacité d'Amitiza pour le traitement de la constipation induite par des opiacés chez des patients traités par des opiacés de la classe des diphénylheptanes (par ex. la méthadone) n'a pas été établie.

Ultibro® Breezhaler® (indacatérol, glycopyrronium) NOVARTIS PHARMA

Nouveau traitement de la BPCO

Swissmedic a délivré une autorisation de mise sur le marché pour un nouveau traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) associant le maléate d'indacatérol et le bromure de glycopyrronium. Ultibro Breezhaler est indiqué dans le traitement bronchodilatateur d'entretien des patients symptomatiques atteints de BPCO, chez lesquels un traitement en monothérapie à faible dose par un antagoniste muscarinique à longue durée d'action ou un bêta-2-agoniste à longue durée d'action n'est pas suffisant. La dose recommandée s'élève à une gélule de 110/50 µg une fois par jour à l'aide de l'inhalateur Ultibro Breezhaler.

Tecfidera® (diméthylfumarate) BIOGEN IDEC

Autorisé pour le traitement de la sclérose en plaques

La spécialité Tecfidera à base de diméthylfumarate est à présent autorisée en Suisse. Tecfidera est indiqué dans le traitement des patients atteints de sclérose en plaques de forme récurrente-rémittente, pour réduire la fréquence des poussées. Il est recommandé d'instaurer le traitement avec 120 mg 2 fois par jour pendant 7 jours, avant de passer à 240 mg 2 fois par jour.

Marché

Octreotid Labatec® LABATEC

Nouvelle commercialisation

Ampoules à 0,05 mg/ml, 0,1 mg/ml et 0,5 mg/ml d'octréotide et flacon à 0,2 mg/ml d'octréotide.