compendium update

Novembre 2014

Le contenu de cette rubrique est de la responsabilité de Documed SA.
Ce bulletin est un extrait de nos informations sur l'actualité des médicaments. Les informations complètes peuvent être consultées sur compendium.ch by Documed

Sécurité thérapeutique

(III = importance élevée, II = moyenne, I = faible)

III **Quétiapine**
Nouveaux effets indésirables
Des cas d'agranulocytose ont été rapportés chez des patients traités par la quétiapine tant dans le cadre des études cliniques (rares) qu'après la commercialisation (y compris des cas mortels).
Une cardiomyopathie et une myocardite ont été observées au cours des études cliniques et après la commercialisation; le lien de causalité avec la quétiapine n'a pas pu être exclu. Il convient de reconsidérer le traitement par la quétiapine chez les patients chez qui on suspecte une myocardite ou une cardiomyopathie.
Une occlusion intestinale a été rarement rapportée au cours du traitement par la quétiapine, dont des cas mortels chez des patients présentant un risque élevé d'occlusion intestinale, y compris des patients recevant une polymédication diminuant la motilité intestinale, et/ou chez des patients ne signalant éventuellement pas les symptômes d'une constipation.
Des cas de rétention urinaire ont été occasionnellement observés.

III **Sutent® (sunitinib)**
Nouveaux effets indésirables
Sous traitement par Sutent, des cas d'hypoglycémies sont fréquemment apparus, dont certains cliniquement symptomatiques. Afin de réduire le risque d'hypoglycémie, la glycémie des patients diabétiques doit être mesurée régulièrement, car la posologie de l'insuline ou des antidiabétiques oraux doit être éventuellement adaptée.
On a rapporté occasionnellement des cas de perforations gastro-intestinales, dont des cas d'évolution fatale, et fréquemment des douleurs thoraciques et des affections pseudo-grippales.

Innovations

Menveo® (vaccin méningococcique) NOVARTIS PHARMA
Extension d'indication: enfants dès 2 ans
Menveo est désormais indiqué pour l'immunisation active des enfants dès 2 ans présentant un risque d'exposition aux méningocoques des sérogroupes A, C, W-135 et Y. La sécurité de Menveo chez les enfants âgés de 2 à 10 ans a été évaluée au cours de quatre études cliniques qui ont inclus 3181 enfants ayant reçu Menveo. La réactogénicité locale et systémique ainsi que le taux des autres événements indésirables étaient globalement similaires entre les sujets recevant Menveo et ceux recevant des vaccins comparables.

Mozobil® (plérixafor) SANOFI-AVENTIS
Nouvel immunostimulant autorisé par Swissmedic
Swissmedic a délivré une autorisation de mise sur le marché pour le plérixafor, un antagoniste réversible et sélectif du récepteur de chimiokine CXCR4. Il est indiqué en association avec le G-CSF pour la mobilisation des cellules souches hématopoïétiques dans le sang périphérique avant leur collecte, en vue d'une autogreffe chez les patients atteints de lymphome non hodgkinien ou de myélome multiple dont les cellules se mobilisent mal.

Suvorexant
Premier antagoniste des récepteurs de l'orexine autorisé par la FDA
Le suvorexant (Belsomra®) est un hypnotique d'un nouveau genre autorisé par la FDA. C'est le premier représentant des antagonistes des récepteurs de l'orexine qui agissent sur la régulation du rythme veille/sommeil. Belsomra sera disponible début 2015 sur le marché aux Etats-Unis sous la forme de comprimés aux dosages de 5 mg, 10 mg, 15 mg et 20 mg. Une dose initiale de 10 mg, à prendre en une seule fois 30 minutes avant le coucher, est recommandée. Si l'effet est insuffisant, la dose peut être augmentée jusqu'à un maximum de 20 mg par jour. Aucune information n'est encore disponible concernant la commercialisation en Suisse ou en Europe.

Marché

Celecoxib Pfizer® PFIZER
Commercialisation d'une nouvelle spécialité co-marketing de Celebrex®
Capsules à 100 mg et 200 mg de célécoxib.

Coveram® plus SERVIER
Nouvelle commercialisation
Comprimés pelliculés à 5 mg/5 mg/1,25 mg, 5 mg/10 mg/1,25 mg, 10 mg/5 mg/2,5 mg et 10 mg/10 mg/2,5 mg de périndopril arginine, d'amlodipine et d'indapamide.