

compendium update

Décembre 2014



Le contenu de cette rubrique est de la responsabilité de Documed SA.

Ce bulletin est un extrait de nos informations sur l'actualité des médicaments. Les informations complètes peuvent être consultées sur compendium.ch

Sécurité thérapeutique

(III = Importance élevée, II = moyenne, I = faible)

III Praxilene® 200 (naftidrofuryl)

Restriction des indications et adaptation posologique

Praxilene n'est plus indiqué pour le traitement des suites d'accidents ischémiques cérébraux récents ni en cas d'insuffisance circulatoire diffuse liée à l'âge se manifestant par des troubles confusionnels et psycho-comportementaux.

La dose devra être réduite en cas d'insuffisance rénale sévère, étant donné que le naftidrofuryl est éliminé à 80% sous forme de métabolites dans l'urine, en particulier sous forme conjuguée.

II Picoprep®

Nouvelles recommandations concernant le mode d'emploi

Le contenu dissous d'un sachet est pris la veille de l'intervention avant 8 heures du matin, puis il faut boire au moins 5 fois 250 ml d'un liquide clair, répartis sur plusieurs heures. Le contenu dissous du deuxième sachet est pris 6 à 8 heures plus tard, puis il faut boire au moins 3 fois 250 ml d'un liquide clair, répartis sur plusieurs heures. Il est possible de boire des liquides clairs jusqu'à 2 heures avant l'intervention. Les liquides clairs comprennent les jus de fruits sans pulpe, les boissons rafraîchissantes, les bouillons clairs, le thé, le café (sans lait ni crème) et l'eau. Il ne faut pas boire exclusivement de l'eau.

II Montelukast

Nouvel effet indésirable

Après la mise sur le marché, des cas d'énurésie ont été rapportés chez les enfants.

Innovations

Nexavar® (sorafénib) BAYER

Extension d'indications: carcinome thyroïdien

Nexavar est à présent indiqué pour le traitement des patients atteints du carcinome thyroïdien progressif, localement avancé ou métastatique, différencié et réfractaire à l'iode radioactif. Il est recommandé de surveiller étroitement la calcémie chez les patients traités par Nexavar pour un carcinome thyroïdien différencié. Dans les essais cliniques, l'hypocalcémie a été plus fréquente et plus sévère chez les patients atteints d'un carcinome thyroïdien différencié, en particulier ceux présentant des antécédents d'hypoparathyroïdie, que chez les patients atteints d'un carcinome rénal ou hépatocellulaire.

MultiHance® 0,5 mmol/ml (gadobénate de diméglumine) BRACCO SUISSE

Extension d'indications: IRM des seins

MultiHance est désormais indiqué pour l'IRM des seins féminins pour la détection des lésions malignes chez des patientes pour lesquelles a été diagnostiqué ou suspecté un cancer du sein sur la base d'une mammographie ou échographie antérieure. La dose recommandée est de 0,1 mmol/kg.

Daclatasvir

Nouveau traitement de l'hépatite C

L'arrivée d'une nouvelle génération d'antiviraux à action directe sur le VHC modifie les stratégies thérapeutiques actuelles de prise en charge de l'hépatite C. Après l'autorisation du sofosbuvir (Sovaldi®) et du siméprévir (Olysio®), l'Agence européenne EMA a maintenant donné son feu vert pour la commercialisation du daclatasvir (Daklinza®, comprimés à 30 mg et 60 mg), qui s'utilise en association avec d'autres médicaments tels que le sofosbuvir, la ribavirine et, selon le génotype viral, l'interféron pégylé. Daklinza est déjà disponible en Allemagne. Aucune date de mise sur le marché n'est encore connue pour la Suisse.

Marché

Cholib® ABBOTT

Nouvel hypolipémiant combiné

Comprimés pelliculés à 145 mg de fénofibrate et 20 mg resp. 40 mg de simvastatine.

Striverdi® Respimat® BOEHRINGER INGELHEIM

Nouvelle commercialisation

Solution pour inhalation à 2,5 µg d'olodatérol par bouffée pour le traitement de la BPCO.