compendium update

Februar 2014

Die inhaltliche Verantwortung für die Rubrik «compendium update» liegt bei der Documed AG.
Dieses Bulletin ist ein Auszug aus unseren aktuellen Arzneimittelinformationen. Vollständige Informationen finden Sie unter compendium.ch by Documed

Arzneimittelsicherheit

(III = hohe, II = mittlere, I = geringe Relevanz)

III **Dogmatil® (Sulpirid)**
Neue Kontraindikationen
Dogmatil ist neu auch bei akuter Porphyrie oder in Kombination mit Anti-Parkinsonmitteln (einschliesslich Ropinirol) kontraindiziert.

II **Chininsulfat 250 Hänseler**
Keine Daten bei Kindern unter 12 Jahren
Die Anwendung und Sicherheit von Chininsulfat 250 Hänseler Dragées bei Kindern unter 12 Jahren ist bisher nicht geprüft worden.

II **Demetrin® (Prazepam)**
Aufhebung Kontraindikation Glaukom
Demetrin ist neu bei Engwinkelglaukom nicht mehr kontraindiziert.

II **Vimpat® (Lacosamid)**
Beginn der Therapie mit Aufsättigungsdosis möglich
Zu Behandlungsbeginn wird eine Dosis von 50 mg 2× täglich empfohlen, mit Erhöhung auf 2× täglich 100 mg nach einer Woche. Die Behandlung mit Lacosamid kann auch mit einer einzelnen Aufsättigungsdosis von 200 mg begonnen und ungefähr 12 Stunden später mit 2× täglich 100 mg als Erhaltungsdosis fortgeführt werden. Diese Aufsättigungsdosis kann auch bei Patienten mit leicht bis mässig eingeschränkter Nierenfunktion erwogen werden.

Innovationen

Vipidia® (Alogliptin) TAKEDA
Zulassung für neuen DPP-4-Inhibitor
Mit Alogliptin (Vipidia, Filmtabletten zu 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg) ist nun auch in der Schweiz ein weiterer Vertreter aus der Gruppe der DPP-4-Inhibitoren im Handel. Vipidia ist zusätzlich zu einer Ernährungsumstellung und körperlicher Bewegung bei Erwachsenen mit Diabetes mellitus Typ 2 indiziert. Das Arzneimittel wird in Kombination mit Metformin, einem Sulfonylharnstoff oder Insulin (mit oder ohne Metformin) verabreicht, wenn sich durch diese Wirkstoffe alleine keine ausreichende glykämische Kontrolle erreichen lässt.

Xtandi™ (Enzalutamid) ASTELLAS
Therapieoption bei fortgeschrittenem Prostatakarzinom
Mit Enzalutamid (Xtandi, Kapseln zu 40 mg) steht für Patienten mit fortgeschrittenem Prostatakarzinom eine neue Behandlungsmöglichkeit zur Verfügung. Xtandi ist indiziert in Kombination mit LHRH-Agonisten zur Behandlung bei Patienten mit metastasierendem, kastrationsresistentem Prostatakarzinom bei Progression unter oder nach Docetaxel-Therapie.

Valdoxan® (Agomelatin) SERVIER
Indikationserweiterung: ältere Patienten bis 75 Jahre
Bisher war die Anwendung von Valdoxan aufgrund begrenzter klinischer Daten bei Patienten über 65 Jahre nicht empfohlen. Eine Studie belegt nun bei älteren depressiven Patienten (<75 Jahren) die Wirksamkeit und die Sicherheit von Agomelatin (25 bis 50 mg/Tag). Eine Dosisanpassung hinsichtlich des Alters ist nicht erforderlich. Bei Patienten ≥75 Jahre wurde die Wirksamkeit nach wie vor nicht belegt. Agomelatin sollte deshalb bei Patienten dieser Altersgruppe nicht angewendet werden.

Markt

Spasmex® 20 mg ZELLER MEDICAL
Neu im Handel
Eine Filmtablette enthält 20 mg Trospiumchlorid.

Mometasonfuroat Sandoz® Dosier-Nasenspray SANDOZ
Neu im Handel
Eine Einzeldosis enthält 50 µg Mometasonfuroat.