

# compendium update

September 2014



Die inhaltliche Verantwortung für die Rubrik «compendium update» liegt bei der Documed AG.

Dieses Bulletin ist ein Auszug aus unseren aktuellen Arzneimittelinformationen. Vollständige Informationen finden Sie unter

**compendium.ch**  
by Documed

## Arzneimittelsicherheit

(III = hohe, II = mittlere, I = geringe Relevanz)

### II Actemra® (Tocilizumab)

#### Neue unerwünschte Wirkung

Es wurde von unter der Behandlung mit Tocilizumab auftretendem Stevens-Johnson-Syndrom berichtet.

### II Olbetam® (Acipimox)

#### Strengere Dosierungsempfehlungen bei Nierenfunktionsstörungen

Bei eingeschränkter Nierenfunktion muss die Dosierung in Abhängigkeit der Kreatinin-Clearance reduziert werden: bei Werten zwischen 40 und 60 ml/min (vorher zwischen 40 und 80 ml/min) 1 Kapsel Olbetam täglich, und zwischen 30 und 40 ml/min (vorher zwischen 20 und 40 ml/min) 1 Kapsel Olbetam jeden zweiten Tag.

Bei einer Kreatinin-Clearance <30 ml/min (vorher <10 ml/min) ist Olbetam kontraindiziert.

### II Rocaltrol® (Calcitriol)

#### Dosierungsempfehlungen für Säuglinge und Kleinkinder aufgehoben

Da die Sicherheit und Wirksamkeit der Rocaltrol Kapseln bei Kindern ungenügend untersucht sind, wurde die Dosierungsempfehlung für Säuglinge und Kleinkinder aufgehoben.

### II Zytiga® (Abirateron)

#### Interaktionen mit starken CYP3A4-Induktoren

Die gleichzeitige Anwendung starker CYP3A4-Induktoren wie z.B. Phenytoin, Carbamazepin, Rifampicin, Rifabutin, Phenobarbital oder Johanniskraut sollte vermieden werden, da eine reduzierte Wirksamkeit von Zytiga möglich ist.

## Innovationen

### Amitiza® (Lubiproston) SUCAMPO

#### Indikationserweiterung: Opiat-induzierte Obstipation

Amitiza ist neu auch indiziert für die Behandlung von Opiat-induzierter Obstipation und damit einhergehenden Anzeichen und Symptomen wie harter Stuhlkonsistenz, schmerzhaftem Stuhlgang, schwerer Obstipation, Bauchbeschwerden und abdominalen Blähungen bei Erwachsenen ab 18 Jahren, die unter nicht tumorbedingten chronischen Schmerzen leiden.

Die Wirksamkeit von Amitiza für die Behandlung von Opiat-induzierter Obstipation wurde bei Patienten, die Opiate der Klasse der Diphenylheptane wie Methadon einnahmen, nicht gezeigt.

### Ultibro® Breezhaler® (Indacaterol, Glycopyrronium) NOVARTIS PHARMA

#### Neue Therapieoption bei COPD

Swissmedic hat die Zulassung für ein kombiniertes Arzneimittel (Indacaterolmaleat und Glycopyrroniumbromid) bei chronischer obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) erteilt. Ultibro Breezhaler ist für die bronchienerweiternde Erhaltungstherapie bei symptomatischen Erwachsenen mit COPD angezeigt, bei welchen eine tief dosierte Monotherapie mit langwirksamen Muskarinantagonisten oder Beta-2-Sympathomimetika allein nicht genügend ist. Die empfohlene Dosis beträgt eine Kapsel zu 110/50 µg einmal täglich mit dem Ultibro Breezhaler-Inhalator.

### Tecfidera® (Dimethylfumarat) BIOGEN IDEC

#### Zulassung bei Multipler Sklerose

In der Schweiz ist neu die Spezialität Tecfidera mit dem Wirkstoff Dimethylfumarat zugelassen. Tecfidera ist für die orale Behandlung von Patienten mit schubförmig remittierend verlaufender Multipler Sklerose zur Reduzierung der Schubhäufigkeit indiziert. Die Anfangsdosis beträgt 120 mg zweimal täglich, nach 7 Tagen wird die Dosis auf 240 mg zweimal täglich gesteigert.

## Markt

### Octreotid Labatec® LABATEC

#### Neu im Handel

Es sind Ampullen zu 0,05 mg/ml, 0,1 mg/ml und 0,5 mg/ml Octreotid und eine Durchstechflasche zu 0,2 mg/ml Octreotid erhältlich.