

compendium update

Février 2015



Le contenu de cette rubrique est de la responsabilité de Documed SA.

Ce bulletin est un extrait de nos informations sur l'actualité des médicaments. Les informations complètes peuvent être consultées sur compendium.ch

by Documed

Sécurité thérapeutique

(III = importance élevée, II = moyenne, I = faible)

II Invanz® (ertapénem)

Nouvel effet indésirable

Des taches sur les dents ont été rapportées après la commercialisation.

II Loniten® (minoxidil)

Adaptation posologique en cas d'altération de la fonction hépatique

Chez les patients ayant une altération de la fonction hépatique, une adaptation de la dose doit être envisagée: début du traitement avec une dose réduite administrée une fois par jour, puis titration de la dose jusqu'à obtention de la plus faible dose efficace.

II Nicorandil

Nouvel effet indésirable

Des cas isolés d'hyperkaliémie ont été rapportés. La prudence s'impose en cas d'utilisation concomitante de nicorandil et de médicaments pouvant faire augmenter la kaliémie.

Innovations

Adempas® (riociguat) BAYER

Extension d'indication: hypertension artérielle pulmonaire

Adempas est indiqué pour améliorer la capacité à l'effort chez les patients adultes atteints d'hypertension artérielle pulmonaire de classe fonctionnelle OMS II à III. L'efficacité a été démontrée tant en monothérapie qu'en association avec des antagonistes des récepteurs de l'endothéline ou des prostanoides.

Cayston® (aztréonam) GILEAD

Extension d'indication: enfants dès 6 ans

Cayston est désormais indiqué chez les enfants dès 6 ans atteints de mucoviscidose pour le traitement des infections pulmonaires chroniques dues à *Pseudomonas aeruginosa*. La posologie chez l'enfant est identique à celle de l'adulte. L'utilisation de Cayston chez les patients pédiatriques a été associée à une hémoptysie au cours des cycles de traitement et pourrait avoir aggravé des pathologies sous-jacentes.

Yervoy® (ipilimumab) BRISTOL-MYERS SQUIBB

Extension d'indication: traitement de première ligne

Yervoy est à présent indiqué comme traitement de première ligne du mélanome avancé (non résecable ou métastatique) chez l'adulte.

Vaccin anti-papillomavirus

Vaccin nonavalent autorisé par la FDA

En décembre 2014, la FDA a autorisé la commercialisation de Gardasil 9 aux Etats-Unis. Il s'agit d'une nouvelle formulation du vaccin Gardasil, incluant 5 sérotypes additionnels (HPV 31, 33, 45, 52 et 58). Ce vaccin est indiqué dans la prévention des lésions précancéreuses et des cancers du col de l'utérus, du vagin, de la vulve et de l'anus, ainsi que celle des verrues génitales dues aux HPV 6 ou 11 (condylomes acuminés). La date de commercialisation en Suisse n'est pas connue.

Marché

Edarbyclor® TAKEDA

Nouvel antihypertenseur

Comprimés pelliculés à 40 mg d'azilsartan médoxomil et 12,5 mg resp. 25 mg de chlortalidon.

Méthylphénidate Sandoz® SANDOZ

Nouvelle commercialisation

Comprimés retard à 18 mg, 27 mg, 36 mg et 54 mg de chlorhydrate de méthylphénidate.

