compendium update

Septembre 2015

Le contenu de cette rubrique est de la responsabilité de Documed SA.
Ce bulletin est un extrait de nos informations sur l'actualité des médicaments. Les informations complètes peuvent être consultées sur compendium.ch by Documed

Sécurité thérapeutique

(III = importance élevée, II = moyenne, I = faible)

III Oxaliplatine
Nouveaux effets indésirables, nouvelles interactions
Un allongement de l'intervalle QT et des arythmies ventriculaires, comprenant des torsades de pointes, ont été rarement signalés. Une surveillance étroite de l'intervalle QT est fortement recommandée lors de traitement concomitant par des médicaments connus pour prolonger l'intervalle QT.
De rares cas de rhabdomyolyse, y compris d'issue fatale, ont été rapportés. En cas de douleurs musculaires et d'œdèmes accompagnés de faiblesse, de fièvre ou d'urines foncées, le traitement par l'oxaliplatine doit être interrompu et des mesures appropriées instaurées. La prudence et une surveillance étroite sont recommandées lors de traitement concomitant par des médicaments connus pour causer une rhabdomyolyse. En outre, des cas de coagulation intravasculaire disséminée, d'ulcère duodénal et d'hypocalcémie ont été observés.

II Blopress® (candesartan)
Précision de l'indication, associations non recommandées
Le traitement adjuvant aux inhibiteurs de l'ECA est seulement indiqué chez les patients présentant une insuffisance cardiaque symptomatique malgré un traitement optimal et ne tolérant pas les antagonistes des récepteurs des minéralocorticoïdes.
La triple association d'un inhibiteur de l'ECA, d'un diurétique d'épargne potassique et de candesartan est déconseillée. De telles associations ne doivent être utilisées que sous la surveillance d'un spécialiste, avec des contrôles réguliers de la fonction rénale, des taux d'électrolytes et de la pression artérielle.

II Eligard® (acétate de leuproréline)
Nouvelles remarques concernant le stockage
Une fois sorti du réfrigérateur, le produit peut être conservé dans son emballage d'origine à température ambiante (ne dépassant pas 25 °C) jusqu'à 4 semaines maximum.

Innovations

Otezla® (aprémilast)
Psoriasis et le rhumatisme psoriasique
Un nouveau médicament oral est disponible en Suisse pour les patients souffrant de psoriasis, l'aprémilast (Otezla comprimés à 10, 20 et 30 mg). Il est indiqué chez l'adulte dans le traitement de deuxième ligne du psoriasis en plaques modéré à sévère et du rhumatisme psoriasique actif. Dans cette dernière indication, il peut être utilisé seul ou en association avec d'autres DMARD. L'aprémilast est un immunosuppresseur, inhibiteur sélectif de la phosphodiestérase 4 (PDE4), une enzyme qui joue un rôle essentiel dans les processus inflammatoires de la maladie. En bloquant la PDE4, l'aprémilast réduit le taux de cytokines dans l'organisme et diminue ainsi l'inflammation et d'autres symptômes de la maladie psoriasique. La dose initiale de 10 mg le premier jour du traitement est augmentée progressivement sur une semaine jusqu'à la dose recommandée de 30 mg deux fois par jour. S'il n'y a aucune amélioration après six mois, la stratégie thérapeutique doit être réévaluée.

Liraglutide
AMM européenne pour la perte du poids
L'Agence européenne du médicament EMA a délivré une autorisation de mise sur le marché au liraglutide (Saxenda® stylo prérempli) pour aider à perdre du poids. Ce médicament s'utilise en complément d'un régime alimentaire et de l'exercice physique chez les adultes obèses (IMC ≥30) ou en surpoids (IMC 27–30) qui présentent au moins un facteur de comorbidité lié au poids (prédiabète ou diabète de type 2, hypertension artérielle, dyslipidémie ou syndrome d'apnée obstructive du sommeil). La date de commercialisation dans l'UE n'est pas encore fixée. Aucune information n'est disponible concernant la Suisse.

Marché

Paroxétine Spirig HC 20®
SPIRIG HEALTHCARE
Nouvelle commercialisation
Comprimés pelliculés à 20 mg de paroxétine.

Rizatriptan-Mepha oro®
comprimés orodispersibles MEPHA
Nouvelle commercialisation
Comprimés orodispersibles à 5 mg et 10 mg de rizatriptan.