compendium update

April 2015

Die inhaltliche Verantwortung für die Rubrik «compendium update» liegt bei der Documed AG.
Dieses Bulletin ist ein Auszug aus unseren aktuellen Arzneimittelinformationen. Vollständige Informationen finden Sie unter compendium.ch

Arzneimittelsicherheit

(III = hohe, II = mittlere, I = geringe Relevanz)

III **Clindamycin oral und parenteral**
Neue Dosierungsempfehlung für Kinder
Die Anwendung von Clindamycin parenteral bei Säuglingen im ersten Lebensmonat wird nicht mehr empfohlen.
Die Dosierungsempfehlungen für die Lösung gelten neu für Kinder ab 10 kg, bei Kindern unter 10 kg gilt eine Dosierung von 3-mal täglich ½ Messlöffel Lösung (37,5 mg) als empfohlene Mindestdosis.

II **Bosulif® (Bosutinib)**
Anpassung der Dosierung bei eingeschränkter Nierenfunktion
Bei mittelschwerer Nierenfunktionsstörung (Clcr 30 bis 50 ml/min) beträgt die empfohlene Dosis neu 400 mg einmal täglich. Bei schwerer Nierenfunktionsstörung (Clcr <30 ml/min) beträgt die empfohlene Dosis wie bisher 300 mg einmal täglich. Eine Dosissteigerung auf 500 mg einmal täglich bei Patienten mit mittelschwerer Nierenfunktionsstörung oder auf 400 mg einmal täglich bei Patienten mit schwerer Nierenfunktionsstörung kann erwogen werden, falls sie nicht unter schweren oder persistierenden mittelschweren unerwünschten Wirkungen leiden und suboptimales hämatologisches Ansprechen in der Woche 8 oder suboptimales zytogenetisches Ansprechen in der Woche 12 zeigen.

Innovationen

Cosentyx® (Secukinumab) NOVARTIS PHARMA
Neues Arzneimittel gegen Psoriasis
Swissmedic hat die Marktzulassung für Secukinumab (Cosentyx) erteilt. Der neue monoklonale Antikörper ist zur Behandlung erwachsener Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis indiziert, die auf andere systemische Therapien einschliesslich Ciclosporin, Methotrexat oder PUVA nicht angesprochen haben, bei denen diese Therapien kontraindiziert sind oder die diese Therapien nicht tolerieren. Secukinumab bindet an Interleukin-17A und verhindert die Interaktion mit dem IL-17-Rezeptor, der von unterschiedlichen Zelltypen wie z.B. Keratinozyten exprimiert wird. Durch die selektive Bindung wird die Freisetzung verschiedener Entzündungsmediatoren verhindert. Die empfohlene Dosierung beträgt 300 mg. Das Medikament wird in den ersten fünf Wochen einmal wöchentlich und anschliessend alle vier Wochen subkutan appliziert.

Pradaxa® (Dabigatran etexilat) BOEHRINGER INGELHEIM
Indikationserweiterung: tiefe Venenthrombose und Lungenembolie
Pradaxa ist indiziert bei Erwachsenen für die Therapie der tiefen Venenthrombose und Lungenembolie nach vorhergehender Behandlung mit fraktioniertem oder unfraktioniertem Heparin für mindestens 5 Tage sowie für die Prophylaxe der rezidivierenden tiefen Venenthrombose und Lungenembolie. Die empfohlene Dosierung beträgt 150 mg zweimal täglich.

Sylvant® (Siltuximab) JANSSEN-CILAG
Behandlung der multizentrischen Castleman-Krankheit
In der Schweiz steht neu ein Medikament zur Behandlung der seltenen, lymphoproliferativen Castleman-Krankheit zur Verfügung. Der monoklonale Antikörper Siltuximab (Sylvant) ist indiziert zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit multizentrischer Castleman-Krankheit, die HIV-negativ und auf humanes Herpesvirus-8 negativ sind. Die Verabreichung erfolgt alle drei Wochen als intravenöse Infusion über eine Stunde.

Markt

Efavirenz-Mepha® 600 mg MEPHA
Erstes Generikum von Stocrin® im Handel
Lactab zu 600 mg Efavirenz.

Oxynorm® MUNDIPHARMA
Neue galenische Form
Schmelztabletten zu 5 mg, 10 mg und 20 mg Oxycodon hydrochlorid.