compendium update

Juni 2015

Die inhaltliche Verantwortung für die Rubrik «compendium update» liegt bei der Documed AG.
Dieses Bulletin ist ein Auszug aus unseren aktuellen Arzneimittelinformationen. Vollständige Informationen finden Sie unter compendium.ch by Documed

Arzneimittelsicherheit

(III = hohe, II = mittlere, I = geringe Relevanz)

III Tecfidera® (Dimethylfumarat)
Neue Kontraindikation
Tecfidera ist bei progressiver multifokaler Leukoenzephalopathie (PML) oder Verdacht auf PML kontraindiziert. Im Rahmen einer klinischen Studie ereignete sich unter der Behandlung mit Tecfidera ein tödlich verlaufender Fall von PML, der im Rahmen einer schweren und prolongierten Lymphopenie auftrat, welche ein bekannter Risikofaktor für opportunistische Infektionen wie PML ist. Weitere Meldungen von PML-Fällen wurden unter der Behandlung mit Tecfidera gemeldet. Eine engmaschige Beurteilung des vollständigen Blutbilds wird in den ersten 1,5 Jahren (bisher im ersten halben Jahr) mindestens alle 3 Monate und danach mindestens alle 6 bis 12 Monate sowie bei Vorliegen einer entsprechenden klinischen Indikation empfohlen.

II Metamizol
Interaktionen mit Acetylsalicylsäure und Bupropion
Die gleichzeitige Einnahme von Metamizol und Acetylsalicylsäure kann den thrombozytenaggregationshemmenden Effekt von Acetylsalicylsäure abschwächen. Daher ist diese Kombination bei Patienten, die aufgrund der kardioprotektiven Wirkung mit niedrigdosierter Acetylsalicylsäure behandelt werden, mit Vorsicht zu betrachten.
Metamizol kann zu einer Senkung der Bupropion-Konzentration und einer Erhöhung des aktiven 4-Hydroxybupropion-Metaboliten im Blut führen. Daher sollte eine gleichzeitige Behandlung mit Metamizol und Bupropion nur mit grösster Vorsicht erfolgen.

Innovationen

Lixiana® (Edoxaban) DAIICHI SANKYO
Neuer Faktor-Xa-Hemmer
Mit Edoxaban (Lixiana, Filmtabletten zu 15 mg, 30 mg und 60 mg) ist in der Schweiz ein neuer Faktor-Xa-Hemmer erhältlich. Das Arzneimittel ist bei Erwachsenen für folgende Indikationen zugelassen: Prophylaxe von Schlaganfällen und systemischen Embolien bei nicht-valvulärem Vorhofflimmern, Behandlung von venösen Thromboembolien einschliesslich tiefer Venenthrombosen und Lungenembolien nach vorhergehender Behandlung mit fraktioniertem oder unfraktioniertem Heparin für 5 Tage, Prophylaxe von rezidivierenden venösen Thromboembolien.

Lemtrada® (Alemtuzumab) SANOFI-AVENTIS
Neue Therapieoption bei Multipler Sklerose
In der Schweiz ist neu das Medikament Lemtrada (Alemtuzumab) im Handel. Lemtrada wird als Infusion zur Behandlung von Erwachsenen mit aktiver, schubförmig-remittierender Multipler Sklerose eingesetzt. Es handelt sich um einen rekombinanten, humanisierten, monoklonalen Antikörper, der sich selektiv gegen das Oberflächenantigen CD52 richtet. Dieses kommt in hohen Konzentrationen auf T- und B-Lymphozyten vor. Nach der Bindung an CD52 kommt es zu einer raschen Abnahme an T- und B-Lymphozyten. Danach setzt innerhalb weniger Wochen eine Repopulation der Immunzellen ein. Die Forscher sprechen hier von einer Reprogrammierung des Immunsystems, welche das Potential für einen nächsten Krankheitsschub reduzieren und das Fortschreiten der Erkrankung verzögern kann. Die Behandlung erfolgt in zwei Behandlungszyklen mit fünf bzw. drei Infusionen (i.v., 12 mg tgl.) im Abstand von einem Jahr.

Markt

Omnitrope® 5/10/15 SANDOZ
Neues Injektionsgerät
Neu sind Omnitrope-Patronen 5 mg, 10 mg bzw. 15 mg für das Injektionsgerät SurePal™ erhältlich.

Noxafil® MSD
Neue galenische Form
Neu sind magensaftresistente Tabletten zu 100 mg Posaconazol erhältlich.